


2008 普通高等学校招生考试 (陕西卷理)

一、选择题

1. 复数 $\frac{i(2+i)}{1-2i}$ 等于 ()
(A) i (B) $-i$ (C) 1 (D) -1
2. 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 集合 $A = \{x | x^2 - 3x + 2 = 0\}$, $B = \{x | x = 2a, a \in A\}$, 则集合 $\complement_U(A \cup B)$ 中元素的个数为 ()
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
3. $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 若 $c = \sqrt{2}$, $b = \sqrt{6}$, $B = 120^\circ$, 则 a 等于 ()
(A) $\sqrt{6}$ (B) 2 (C) $\sqrt{3}$ (D) $\sqrt{2}$
4. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列, $a_1 + a_2 = 4$, $a_7 + a_8 = 28$, 则该数列前 10 项和 S_{10} 等于 ()
(A) 64 (B) 100 (C) 110 (D) 120
5. 直线 $\sqrt{3}x - y + m = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 - 2x - 2 = 0$ 相切, 则实数 m 等于 ()
(A) $\sqrt{3}$ 或 $-\sqrt{3}$ (B) $-\sqrt{3}$ 或 $3\sqrt{3}$ (C) $-3\sqrt{3}$ 或 $\sqrt{3}$ (D) $-3\sqrt{3}$ 或 $3\sqrt{3}$
6. “ $a = \frac{1}{8}$ ”是“对任意的正数 $x, 2x + \frac{a}{x} \geq 1$ ”的 ()
(A) 充分不必要条件 (B) 必要不充分条件
(C) 充要条件 (D) 既不充分也不必要条件
7. 已知函数 $f(x) = 2^{x+3}$, $f^{-1}(x)$ 是 $f(x)$ 的反函数, 若 $mn = 16$ ($m, n \in \mathbf{R}^+$), 则 $f^{-1}(m) + f^{-1}(n)$ 的值为 ()
(A) -2 (B) 1 (C) 4 (D) 10
8. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别是 F_1, F_2 , 过 F_1 作倾斜角为 30° 的直线交双曲线右支于 M 点. 若 MF_2 垂直于 x 轴, 则双曲线的离心率为 ()
(A) $\sqrt{6}$ (B) $\sqrt{3}$ (C) $\sqrt{2}$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{3}$
9. 如图, $\alpha \perp \beta$, $\alpha \cap \beta = l$, $A \in \alpha, B \in \beta$, A, B 到 l 的距离分别是 a 和 b , AB 与 α, β 所成的角分别是 θ 和 φ , AB 在 α, β 内的射影分别是 m 和 n , 若 $a > b$, 则 ()



- (A) $\theta > \varphi, m > n$ (B) $\theta > \varphi, m < n$

- (C) $\theta < \varphi, m < n$ (D) $\theta < \varphi, m > n$

10. 已知实数 x, y 满足 $\begin{cases} y \geq 1, \\ y \leq 2x - 1, \\ x + y \leq m, \end{cases}$ 如果目标函数 $z = x - y$ 的最小值为 -1 , 则实数 m 等于 ()
(A) 7 (B) 5 (C) 4 (D) 3
11. 定义在 \mathbf{R} 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x+y) = f(x) + f(y) + 2xy$ ($x, y \in \mathbf{R}$), $f(1) = 2$, 则 $f(-3)$ 等于 ()
(A) 2 (B) 3 (C) 6 (D) 9
12. 为提高信息在传输中的抗干扰能力, 通常在原信息中按一定规则加入相关数据组成传输信息. 设定原信息为 $a_0a_1a_2$, $a_i \in \{0, 1\}$ ($i = 0, 1, 2$), 传输信息为 $h_0a_0a_1a_2h_1$, 其中 $h_0 = a_0 \oplus a_1$, $h_1 = h_0 \oplus a_2$, \oplus 运算规则为: $0 \oplus 0 = 0, 0 \oplus 1 = 1, 1 \oplus 0 = 1, 1 \oplus 1 = 0$. 例如原信息为 111, 则传输信息为 01111. 传输信息在传输过程中受到干扰可能导致接收信息出错, 则下列接收信息一定有误的是 ()
(A) 11010 (B) 01100 (C) 10111 (D) 00011

二、填空题


13. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1+a)n+1}{n+a} = 2$, 则 $a =$ _____.
14. 长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的各顶点都在球 O 的球面上, 其中 $AB : AD : AA_1 = 1 : 1 : \sqrt{2}$. A, B 两点的球面距离记为 m , A, D_1 两点的球面距离记为 n , 则 $\frac{m}{n}$ 的值为_____.
15. 关于平面向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$. 有下列三个命题:
① 若 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}$, 则 $\mathbf{b} = \mathbf{c}$;
② 若 $\mathbf{a} = (1, k), \mathbf{b} = (-2, 6), \mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$, 则 $k = -3$;
③ 非零向量 \mathbf{a} 和 \mathbf{b} 满足 $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}| = |\mathbf{a} - \mathbf{b}|$, 则 \mathbf{a} 与 $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ 的夹角为 60° .
其中真命题的序号为_____. (写出所有真命题的序号)
16. 某地奥运火炬接力传递路线共分 6 段, 传递活动分别由 6 名火炬手完成. 如果第一棒火炬手只能从甲、乙、丙三人中产生, 最后一棒火炬手只能从甲、乙两人中产生, 则不同的传递方案共有_____种. (用数字作答)

三、解答题

17. 已知函数 $f(x) = 2 \sin \frac{x}{4} \cos \frac{x}{4} - 2\sqrt{3} \sin^2 \frac{x}{4} + \sqrt{3}$.
(1) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期及最值;
(2) 令 $g(x) = f\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$, 判断函数 $g(x)$ 的奇偶性, 并说明理由.

18. 某射击测试规则为: 每人最多射击 3 次, 击中目标即终止射击, 第 i 次击中目标得 $4 - i$ ($i = 1, 2, 3$) 分, 3 次均未击中目标得 0 分. 已知某射手每次击中目标的概率为 0.8, 其各次射击结果互不影响.
(1) 求该射手恰好射击两次的概率;
(2) 该射手的得分记为 ξ , 求随机变量 ξ 的分布列及数学期望.

19. 三棱锥被平行于底面 ABC 的平面所截得的几何体如图所示, 截面为 $A_1B_1C_1$, $\angle BAC = 90^\circ$, $A_1A \perp$ 平面 ABC , $A_1A = \sqrt{3}$, $AB = \sqrt{2}$, $AC = 2$, $A_1C_1 = 1$, $\frac{BD}{DC} = \frac{1}{2}$.
(1) 证明: 平面 $A_1AD \perp$ 平面 BCC_1B_1 ;
(2) 求二面角 $A - CC_1 - B$ 的大小.



20. 已知抛物线 $C: y = 2x^2$, 直线 $y = kx + 2$ 交 C 于 A, B 两点, M 是线段 AB 的中点, 过 M 作 x 轴的垂线交 C 于点 N .
- (1) 证明: 抛物线 C 在点 N 处的切线与 AB 平行;
- (2) 是否存在实数 k 使 $\vec{NA} \cdot \vec{NB} = 0$, 若存在, 求 k 的值; 若不存在, 说明理由.

21. 已知函数 $f(x) = \frac{kx+1}{x^2+c}$ ($c > 0$ 且 $c \neq 1, k \in \mathbf{R}$) 恰有一个极大值点和一个极小值点, 其中一个是 $x = -c$.
- (1) 求函数 $f(x)$ 的另一个极值点;
- (2) 求函数 $f(x)$ 的极大值 M 和极小值 m , 并求 $M - m \geq 1$ 时 k 的取值范围.

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = \frac{3}{5}, a_{n+1} = \frac{3a_n}{2a_n+1}, n = 1, 2, \dots$.
- (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;
- (2) 证明: 对任意的 $x > 0, a_n \geq \frac{1}{1+x} - \frac{1}{(1+x)^2} \left(\frac{2}{3^n} - x \right), n = 1, 2, \dots$;
- (3) 证明: $a_1 + a_2 + \dots + a_n > \frac{n^2}{n+1}$.