

## 2015 普通高等学校招生考试 (江苏卷)

### 一、填空题

- 已知集合  $A = \{1, 2, 3\}$ ,  $B = \{2, 4, 5\}$ , 则集合  $A \cup B$  中元素的个数为\_\_\_\_\_.
- 已知一组数据 4, 6, 5, 8, 7, 6, 那么这组数据的平均数为\_\_\_\_\_.
- 设复数  $z$  满足  $z^2 = 3 + 4i$  ( $i$  是虚数单位), 则  $z$  的模为\_\_\_\_\_.
- 根据如图所示的伪代码, 可知输出的结果  $S$  为\_\_\_\_\_.
 


```

S ← 1
I ← 1
While I < 8
    S ← S + 2
    I ← I + 3
End While
Print S
                
```
- 袋中有形状、大小都相同的 4 只球, 其中 1 只白球、1 只红球、2 只黄球, 从中一次随机摸出 2 只球, 则这 2 只球颜色不同的概率为\_\_\_\_\_.
- 已知向量  $\mathbf{a} = (2, 1)$ ,  $\mathbf{b} = (1, -2)$ , 若  $m\mathbf{a} + n\mathbf{b} = (9, -8)$  ( $m, n \in \mathbf{R}$ ), 则  $m - n$  的值为\_\_\_\_\_.
- 不等式  $2^{x^2-x} < 4$  的解集为\_\_\_\_\_.
- 已知  $\tan \alpha = -2$ ,  $\tan(\alpha + \beta) = \frac{1}{7}$ , 则  $\tan \beta$  的值为\_\_\_\_\_.
- 现有橡皮泥制作的底面半径为 5, 高为 4 的圆锥和底面半径为 2, 高为 8 的圆柱各一个. 若将它们重新制作成总体积与高均保持不变, 但底面半径相同的新的圆锥和圆柱各一个, 则新的底面半径为\_\_\_\_\_.
- 在平面直角坐标系  $xOy$  中, 以点  $(1, 0)$  为圆心且与直线  $mx - y - 2m - 1 = 0$  ( $m \in \mathbf{R}$ ) 相切的所有圆中, 半径最大的圆的标准方程为\_\_\_\_\_.
- 设数列  $\{a_n\}$  满足  $a_1 = 1$ , 且  $a_{n+1} - a_n = n + 1$  ( $n \in \mathbf{N}^*$ ), 则数列  $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$  前 10 项的和为\_\_\_\_\_.
- 在平面直角坐标系  $xOy$  中,  $P$  为双曲线  $x^2 - y^2 = 1$  右支上的一个动点, 若点  $P$  到直线  $x - y + 1 = 0$  的距离大于  $c$  恒成立, 则实数  $c$  的最大值为\_\_\_\_\_.
- 已知函数  $f(x) = |\ln x|$ ,  $g(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x \leq 1, \\ |x^2 - 4| - 2, & x > 1, \end{cases}$  则方程  $|f(x) + g(x)| = 1$  实根的个数为\_\_\_\_\_.
- 设向量  $\mathbf{a}_k = \left(\cos \frac{k\pi}{6}, \sin \frac{k\pi}{6} + \cos \frac{k\pi}{6}\right)$  ( $k = 0, 1, 2, \dots, 12$ ), 则  $\sum_{k=0}^{11} (\mathbf{a}_k \cdot \mathbf{a}_{k+1})$  的值为\_\_\_\_\_.


### 二、解答题

- 在  $\triangle ABC$  中, 已知  $AB = 2$ ,  $AC = 3$ ,  $A = 60^\circ$ .
  - 求  $BC$  的长;
  - 求  $\sin 2C$  的值.


- 如图, 在直三棱柱  $ABC - A_1B_1C_1$  中, 已知  $AC \perp BC$ ,  $BC = CC_1$ , 设  $AB_1$  的中点为  $D$ ,  $B_1C \cap BC_1 = E$ . 求证:
  - $DE \parallel$  平面  $AA_1C_1C$ ;
  - $BC_1 \perp AB_1$ .



- 某山区外围有两条相互垂直的直线型公路, 为进一步改善山区的交通现状, 计划修建一条连接两条公路和山区边界的直线型公路. 记两条相互垂直的公路为  $l_1, l_2$ , 山区边界曲线为  $C$ , 计划修建的公路为  $l$ . 如图所示,  $M, N$  为  $C$  的两个端点, 测得点  $M$  到  $l_1, l_2$  的距离分别为 5 千米和 40 千米, 点  $N$  到  $l_1, l_2$  的距离分别为 20 千米和 2.5 千米. 以  $l_2, l_1$  所在的直线分别为  $x, y$  轴, 建立平面直角坐标系  $xOy$ . 假设曲线  $C$  符合函数  $y = \frac{a}{x^2 + b}$  (其中  $a, b$  为常数) 模型.
  - 求  $a, b$  的值;
  - 设公路  $l$  与曲线  $C$  相切于  $P$  点,  $P$  的横坐标为  $t$ .
    - 请写出公路  $l$  长度的函数解析式  $f(t)$ , 并写出其定义域;
    - 当  $t$  为何值时, 公路  $l$  的长度最短? 求出最短长度.



- 如图, 在平面直角坐标系  $xOy$  中, 已知椭圆  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > b > 0$ ) 的离心率为  $\frac{\sqrt{2}}{2}$ , 且右焦点  $F$  到左准线  $l$  的距离为 3.
  - 求椭圆的标准方程;
  - 过  $F$  的直线与椭圆交于  $A, B$  两点, 线段  $AB$  的垂直平分线分别交直线  $l$  和  $AB$  于点  $P, C$ , 若  $PC = 2AB$ , 求直线  $AB$  的方程.




19. 已知函数  $f(x) = x^3 + ax^2 + b$  ( $a, b \in \mathbf{R}$ ).

(1) 试讨论  $f(x)$  的单调性;

(2) 若  $b = c - a$  (实数  $c$  是与  $a$  无关的常数), 当函数  $f(x)$  有三个不同的零点时,  $a$  的取值范围恰好是  $(-\infty, -3) \cup \left(1, \frac{3}{2}\right) \cup \left(\frac{3}{2}, +\infty\right)$ , 求  $c$  的值.

21. 四选二.

【A】如图, 在  $\triangle ABC$  中,  $AB = AC$ ,  $\triangle ABC$  的外接圆  $\odot O$  的弦  $AE$  交  $BC$  于点  $D$ . 求证:  $\triangle ABD \sim \triangle AEB$ .



【B】已知  $x, y \in \mathbf{R}$ , 向量  $\alpha = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$  是矩阵  $A = \begin{bmatrix} x & 1 \\ y & 0 \end{bmatrix}$  的属于特征值  $-2$  的一个特征向量, 求矩阵  $A$  以及它的另一个特征值.

【C】已知圆  $C$  的极坐标方程为  $\rho^2 + 2\sqrt{2}\rho \sin\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) - 4 = 0$ , 求圆  $C$  的半径.

【D】解不等式  $x + |2x + 3| \geq 2$ .

20. 设  $a_1, a_2, a_3, a_4$  是各项为正数且公差为  $d$  ( $d \neq 0$ ) 的等差数列.

(1) 证明:  $2^{a_1}, 2^{a_2}, 2^{a_3}, 2^{a_4}$  依次构成等比数列;


(2) 是否存在  $a_1, d$ , 使得  $a_1, a_2^2, a_3^3, a_4^4$  依次构成等比数列? 并说明理由;

(3) 是否存在  $a_1, d$  及正整数  $n, k$ , 使得  $a_1^n, a_2^{n+k}, a_3^{n+2k}, a_4^{n+3k}$  依次构成等比数列? 并说明理由.

22. 如图, 在四棱锥  $P-ABCD$  中, 已知  $PA \perp$  平面  $ABCD$ , 且四边形  $ABCD$  为直角梯形,  $\angle ABC = \angle BAD = \frac{\pi}{2}$ ,  $PA = AD = 2$ ,  $AB = BC = 1$ .

(1) 求平面  $PAB$  与平面  $PCD$  所成二面角的余弦值;

(2) 点  $Q$  是线段  $BP$  上的动点, 当直线  $CQ$  与  $DP$  所成的角最小时, 求线段  $BQ$  的长.



23. 已知集合  $X = \{1, 2, 3\}$ ,  $Y_n = \{1, 2, 3, \dots, n\}$  ( $n \in \mathbf{N}^*$ ), 设  $S_n = \{(a, b) \mid a \text{ 整除 } b \text{ 或 } b \text{ 整除 } a, a \in X, b \in Y_n\}$ , 令  $f(n)$  表示集合  $S_n$  所含元素的个数.

(1) 写出  $f(6)$  的值;

(2) 当  $n \geq 6$  时, 写出  $f(n)$  的表达式, 并用数学归纳法证明.