

## 2015 普通高等学校招生考试 (福建卷理)

### 一、选择题

- 若集合  $A = \{i, i^2, i^3, i^4\}$  ( $i$  是虚数单位),  $B = \{1, -1\}$ , 则  $A \cap B =$  ( )  
 (A)  $\{-1\}$  (B)  $\{1\}$  (C)  $\{1, -1\}$  (D)  $\emptyset$
- 下列函数为奇函数的是 ( )  
 (A)  $y = \sqrt{x}$  (B)  $y = |\sin x|$  (C)  $y = \cos x$  (D)  $y = e^x - e^{-x}$
- 若双曲线  $E: \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$  的左、右焦点分别为  $F_1, F_2$ , 点  $P$  在双曲线  $E$  上, 且  $|PF_1| = 3$ , 则  $|PF_2|$  等于 ( )  
 (A) 11 (B) 9 (C) 5 (D) 3
- 为了解某社区居民的家庭年收入与年支出的关系, 随机调查了该社区 5 户家庭, 得到如下统计数据表:


收入 $x$ (万元)	8.2	8.6	10.0	11.3	11.9
支出 $y$ (万元)	6.2	7.5	8.0	8.5	9.8

根据上表可得回归直线方程  $\hat{y} = \hat{b}x + \hat{a}$ , 其中  $\hat{b} = 0.76$ ,  $\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x}$ . 据此估计, 该社区一户年收入为 15 万元家庭的年支出为 ( )

- (A) 11.4 万元 (B) 11.8 万元 (C) 12.0 万元 (D) 12.2 万元

- 若变量  $x, y$  满足约束条件  $\begin{cases} x + 2y \geq 0, \\ x - y \leq 0, \\ x - 2y + 2 \geq 0, \end{cases}$  则  $z = 2x - y$  的最小值等于 ( )  
 (A)  $-\frac{5}{2}$  (B)  $-2$  (C)  $-\frac{3}{2}$  (D) 2

- 阅读如图所示的程序框图, 运行相应的程序, 则输出的结果为 ( )



- (A) 2 (B) 1 (C) 0 (D) -1

- 若  $l, m$  是两条不同的直线,  $m$  垂直于平面  $\alpha$ , 则“ $l \perp m$ ”是“ $l \parallel \alpha$ ”的 ( )

- (A) 充分而不必要条件 (B) 必要而不充分条件  
 (C) 充分必要条件 (D) 既不充分也不必要条件

- 若  $a, b$  是函数  $f(x) = x^2 - px + q$  ( $p > 0, q > 0$ ) 的两个不同的零点, 且  $a, b, -2$  这三个数可适当排序后成等差数列, 也可适当排序后成等比数列, 则  $p + q$  的值等于 ( )

- (A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 9

- 已知  $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC}$ ,  $|\overrightarrow{AB}| = \frac{1}{t}$ ,  $|\overrightarrow{AC}| = t$ . 若点  $P$  是  $\triangle ABC$  所在平面内的一点, 且  $\overrightarrow{AP} = \frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|} + \frac{4\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}$ , 则  $\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC}$  的最大值等于 ( )


- (A) 13 (B) 15 (C) 19 (D) 21

- 若定义在  $\mathbf{R}$  上的函数  $f(x)$  满足  $f(0) = -1$ , 其导函数  $f'(x)$  满足  $f'(x) > k > 1$ , 则下列结论中一定错误的是 ( )

- (A)  $f\left(\frac{1}{k}\right) < \frac{1}{k}$  (B)  $f\left(\frac{1}{k}\right) > \frac{1}{k-1}$   
 (C)  $f\left(\frac{1}{k-1}\right) < \frac{1}{k-1}$  (D)  $f\left(\frac{1}{k-1}\right) > \frac{k}{k-1}$

### 二、填空题

- $(x+2)^5$  的展开式中,  $x^2$  的系数等于\_\_\_\_\_. (用数字作答)
- 若锐角  $\triangle ABC$  的面积为  $10\sqrt{3}$ , 且  $AB = 5, AC = 8$ , 则  $BC$  等于\_\_\_\_\_.
- 如图, 点  $A$  的坐标为  $(1, 0)$ , 点  $C$  的坐标为  $(2, 4)$ , 函数  $f(x) = x^2$ . 若在矩形  $ABCD$  内随机取一点, 则此点取自阴影部分的概率等于\_\_\_\_\_.



- 若函数  $f(x) = \begin{cases} -x + 6, & x \leq 2, \\ 3 + \log_a x, & x > 2, \end{cases}$  ( $a > 0$ , 且  $a \neq 1$ ) 的值域是  $[4, +\infty)$ , 则实数  $a$  的取值范围是\_\_\_\_\_.

- 一个二进制码是由 0 和 1 组成的数字串  $x_1x_2 \cdots x_n$  ( $n \in \mathbf{N}^*$ ), 其中  $x_k$  ( $k = 1, 2, \dots, n$ ) 称为第  $k$  位码元. 二进制码是通信中常用的码, 但在通信过程中有时会发生码元错误 (即码元由 0 变为 1, 或者由 1 变为 0). 已知某种二元


码  $x_1x_2 \cdots x_7$  的码元满足如下校验方程组: 
$$\begin{cases} x_4 \oplus x_5 \oplus x_6 \oplus x_7 = 0, \\ x_2 \oplus x_3 \oplus x_6 \oplus x_7 = 0, \\ x_1 \oplus x_3 \oplus x_5 \oplus x_7 = 0, \end{cases}$$
 其中运算  $\oplus$  定义为:  $0 \oplus 0 = 0, 0 \oplus 1 = 1, 1 \oplus 0 = 1, 1 \oplus 1 = 0$ . 现已知一个这种二进制码在通信过程中仅在第  $k$  位发生码元错误后变成了 1101101, 那么利用上述校验方程组可判定  $k$  等于\_\_\_\_\_.

### 三、解答题


- 某银行规定, 一张银行卡若一天内出现 3 次密码尝试错误, 该银行卡将被锁定. 小王到该银行取钱时, 发现自己忘记了银行卡的密码, 但可以确认该银行卡的正确密码是他常用的 6 个密码之一, 小王决定从中不重复地随机选择 1 个进行尝试. 若密码正确, 则结束尝试; 否则继续尝试, 直至该银行卡被锁定.  
 (1) 求当天小王的该银行卡被锁定的概率;  
 (2) 设当天小王用该银行卡尝试密码的次数为  $X$ , 求  $X$  的分布列和数学期望.

- 如图, 在几何体  $ABCDE$  中, 四边形  $ABCD$  是矩形,  $AB \perp$  平面  $BEC$ ,  $BE \perp EC$ ,  $AB = BE = EC = 2$ ,  $G, F$  分别是线段  $BE, DC$  的中点.

- 求证:  $GF \parallel$  平面  $ADE$ ;  
 (2) 求平面  $AEF$  与平面  $BEC$  所成锐二面角的余弦值.



18. 已知椭圆  $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > b > 0$ ) 过点  $(0, \sqrt{2})$ , 且离心率  $e = \frac{\sqrt{2}}{2}$ .
- (1) 求椭圆  $E$  的方程;
- (2) 设直线  $l: x = my - 1$  ( $m \in \mathbf{R}$ ) 交椭圆  $E$  于  $A, B$  两点, 判断点  $G\left(-\frac{9}{4}, 0\right)$  与以线段  $AB$  为直径的圆的位置关系, 并说明理由.



19. 已知函数  $f(x)$  的图象是由函数  $g(x) = \cos x$  的图象经如下变换得到: 先将  $g(x)$  图象上所有点的纵坐标伸长到原来的 2 倍 (横坐标不变), 再将所得到的图象向右平移  $\frac{\pi}{2}$  个单位长度.
- (1) 求函数  $f(x)$  的解析式, 并求其图象的对称轴方程;
- (2) 已知关于  $x$  的方程  $f(x) + g(x) = m$  在  $[0, 2\pi)$  内有两个不同的解  $\alpha, \beta$ .
- ① 求实数  $m$  的取值范围;
- ② 证明:  $\cos(\alpha - \beta) = \frac{2m^2}{5} - 1$ .

20. 已知函数  $f(x) = \ln(1+x), g(x) = kx$  ( $k \in \mathbf{R}$ ).
- (1) 证明: 当  $x > 0$  时,  $f(x) < x$ ;
- (2) 证明: 当  $k < 1$  时, 存在  $x_0 > 0$ , 使得对任意的  $x \in (0, x_0)$ , 恒有  $f(x) > g(x)$ ;
- (3) 确定  $k$  的所有可能取值, 使得存在  $t > 0$ , 对任意的  $x \in (0, t)$ , 恒有  $|f(x) - g(x)| < x^2$ .

21. 已知矩阵  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ .
- (1) 求  $A$  的逆矩阵  $A^{-1}$ ;
- (2) 求矩阵  $C$ , 使得  $AC = B$ .

22. 在平面直角坐标系  $xOy$  中, 圆  $C$  的参数方程为  $\begin{cases} x = 1 + 3\cos t, \\ y = -2 + 3\sin t, \end{cases}$  ( $t$  为参数). 在极坐标系 (与平面直角坐标系  $xOy$  取相同的长度单位, 且以原点  $O$  为极点, 以  $x$  轴非负半轴为极轴) 中, 直线  $l$  的方程为  $\sqrt{2}\rho \sin\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) = m$  ( $m \in \mathbf{R}$ ).
- (1) 求圆  $C$  的普通方程及直线  $l$  的直角坐标方程;
- (2) 设圆心  $C$  到直线  $l$  的距离等于 2, 求  $m$  的值.

23. 已知  $a > 0, b > 0, c > 0$ , 函数  $f(x) = |x+a| + |x-b| + c$  的最小值为 4.
- (1) 求  $a+b+c$  的值;
- (2) 求  $\frac{1}{4}a^2 + \frac{1}{9}b^2 + c^2$  的最小值.